

# Червона книга України

(ВИДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

*ДО МАТЕРІАЛІВ НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВОЇ ПРАКТИКИ З  
ЗООЛОГІЇ БЕЗХРЕБЕТНИХ*

Устриця їстівна  
*Ostrea edulis* L., 1758



### **ВРАЗЛИВИЙ**

Чисельність зменшується через забруднення води і дна моря, добування піску, знищення хижим молюском — рапаною, незаконний промисел.

П'явка медична  
*Hirudo medicinalis* L., 1758



### **ВРАЗЛИВИЙ**

Чисельність знижується через масовий вилов, забруднення та знищення водойм.



Морський кріт  
*Upogebia pusilla* (Pet., 1792)



**РІДКІСНИЙ**

Чисельність знижується від добування піску, забруднення і замулення дна моря.



Трав'яний краб  
*Carcinus aestuarii* Nordo 1847



**РІДКІСНИЙ**

Причини зменшення чисельності: забруднення морської води, періодичні замори, освоєння мілководдя, масовий вилов.




Сольпуга звичайна  
*Galeodes araneoides* (Pallas, 1772)



**РІДКІСНИЙ**

Чисельність зменшується через знищення природних степових ділянок.





**РІДКІСНИЙ**

Причини зміни чисельності: знищення біотопів у зв'язку з рекреаційним навантаженням. Для людини безпечна.

Мухоловка звичайна  
*Scutigera coleoptrata* (L., 1758)





Бабка перев'язана  
*Sympetrum pedemontanum*  
(Allioni, 1776)

### **ВРАЗЛИВИЙ**

Чисельність знижується через забруднення водою агрохімікатами, стічними водами тощо.



Дозорець-імператор  
*Anax imperator* Leach, 1815



### **ВРАЗЛИВИЙ**

Зменшення кількості пов'язане з хімічним та органічним забрудненням, заболочуванням прісних водойм.

Источник: Simone Costa @Naturalist.org

<https://redbook-ua.org/item/anax-imperator-leach/>

<http://zoogalaktika.ru/photos/invertebrata/arthropoda/insecta/odonata/anax-imperator>



Емпуза піщана  
*Empusa pennicornis* (Pall., 1773)

**ВРАЗЛИВИЙ**

Зникає через розорювання цілини, степові пожежі, перевипас та застосування пестицидів.



Дибка степова  
*Saga pedo* (Pallas, 1771)

**РІДКІСНИЙ**

Зникає через розорювання степів, перевипас, зведення колків, викорчовування шибляка, застосування пестицидів.



Ктир велетенський  
*Satanas gigas* (Eversmann, 1855)



**ВРАЗЛИВИЙ**

Зменшення чисельності через розорювання цілинних ділянок, залісення піщаних кучугур, застосування пестицидів.



Вусач мускусний  
*Aromia moschata* (L., 1758)



**ВРАЗЛИВИЙ**

Чисельність може знижуватись внаслідок зменшення насаджень верби та вирубки старих дерев.



Жук-олень, рогач звичайний  
*Lucanus cervus* (L., 1758)



**РІДКІСНИЙ**

Зменшення кількості пов'язане з вирубкою старих дерев. Молоді дерева не придатні для харчування та розмноження виду.



Красотіл пахучий  
*Calosoma sycophanta* (L., 1758).



**ВРАЗЛИВИЙ**

Чисельність зменшується через тривале застосування пестицидів у лісах, вирубування дерев та чагарників.



Левкомігус білосніжний  
*Leucomigus candidatus* (Pallas, 1771)


**РІДКІСНИЙ**

Чисельність знижується через вибирання піску, рекреаційне навантаження, випасання худоби.

© Evgeny Komarov  
<http://insecta.pro>



Скарабей священний  
*Scarabaeus sacer* (L., 1758)




### ЗНИКАЮЧИЙ

Чисельність зменшується через розорювання цілинних степових ділянок, витісняється близьким видом *S. typhon*.



Стрибун Бессера

*Cephalota besseri* (Dejean, 1826)



**РІДКІСНИЙ**

Зниження чисельності відбувається при скороченні природних місць перебування виду внаслідок меліоративних заходів.



Аврора біла  
*Euchloe ausonia* (Hübner, [1804])



\*гусінь




\*імаго

### **ВРАЗЛИВИЙ**

Зменшення кількості пов'язане з розорюванням цілинного степу, викошуванням трав, випасанням худоби та застосуванням пестицидів.



Бражник дубовий  
*Marumba quercus*  
([Denis & Schif.], 1775)



\*імаго

\*гусінь

**РІДКІСНИЙ**

Зникає через застосування пестицидів у лісах, знищення природних біотопів

[http://www.pyrgus.de/Marumba\\_quercus\\_en.html](http://www.pyrgus.de/Marumba_quercus_en.html)

<https://redbook-ua.org/item/marumba-quercusdenisschifermler/> <http://silkmothsandmore.blogspot.com/2019/03/the-sphingids-marumba-quercus.html>



Бражник мертва голова  
*Acherontia atropos* (L., 1758)



\*імаго

\*гусінь

### РІДКІСНИЙ

Чисельність зменшується через через хімічну обробку пасльонових культур (картоплі), знищення чагарників тощо.



Ведмедиця-господиня  
*Callimorpha dominula* (L., 1758)



\*Гусінь

\*імаго

**ВРАЗЛИВИЙ**

Зниження чисельності через освоєння людиною місць перебування та зимівлі, використання пестицидів.





\*гусінь



\*імаго


### **ВРАЗЛИВИЙ**

Зменшення кількості пов'язане з застосуванням пестицидів, надмірним випасанням худоби, викошуванням та випалюванням трав.



Подалірій

*Iphiclides podalirius* (L., 1758)



\*імаго



\*гусінь

### **ВРАЗЛИВИЙ**

Чисельність зменшується через знищення диких плодових дерев та чагарників, надмірне випасання худоби та застосування пестицидів.



Сатир залізний  
*Hipparchia statilinus* (Hufnagel, 1766)



\*імаго



\*гусінь



## РІДКІСНИЙ

Зникає через руйнування біотопів виду: вирубування лісів, розорювання цілинних степів, випалювання трав тощо.



Сатурнія велика  
*Saturnia pyri* ([Denis & Schif.], 1775)

\*Гусінь

\*імаго

### **ВРАЗЛИВИЙ**

Чисельність зменшується через знищення природних біотопів (чагарників, рідколісся тощо), застосування пестицидів у лісах, парках.

[http://tpittaway.tripod.com/silk/s\\_pyr.htm](http://tpittaway.tripod.com/silk/s_pyr.htm)


<https://redbook-ua.org/item/saturnia-pyri-denisschifermler/>

[http://ukrbin.com/show\\_image.php?imageid=77126&big=1](http://ukrbin.com/show_image.php?imageid=77126&big=1)



Синявець Бавій

*Pseudophilotes bavius* (Eversmann, 1832)



\*гусінь

\*імаго

### **ВРАЗЛИВИЙ**

Чисельність зменшується через розорювання степу та його заліснення, надмірний випас худоби, випалювання трави.



Совка сокиркова  
*Periphanes delphinii*  
(L., 1758)

\*гусінь

\*імаго

### **ВРАЗЛИВИЙ**

Зменшення кількості пов'язане з розорюванням степів, лук, застосуванням пестицидів у садах і парках, надмірним випасанням худоби на луках.



Джміль пахучий

*Bombus muscorum* (Pall., 1771)



### **ЗНИКАЮЧИЙ**

Чисельність зменшується через знищення гнізд під час оранки полів або скошування рослин та загибель дорослих особин при обробках пестицидами та під час спалювання сухого листя.



Ксилокопа (бджола-тесляр) звичайна  
*Xylocopa valga* Gerst., 1872

XYLOCOPA VALGA  
ПЧЕЛА-ПЛОТНИК



### РІДКІСНИЙ

Чисельність зменшується через скорочення доступних місць для гніздування внаслідок вирубування та випалювання лісосмуг та незаконне колекціонування.



Евмен трикрапковий  
*Eumenes tripunctatus* (Christ, 1791)



**ВРАЗЛИВИЙ**

Чисельність зменшується через скорочення площ цілинних псамофітних степів.

© Казенас ВДН



Сколія-гігант  
*Megascolia maculata* (Drury, 1773)



### НЕОЦІНЕНИЙ

Чисельність зменшується через використання пестицидів, господарську діяльність людини.



Велетенський мурашиний  
лев західний  
*Acanthaclisis occitanica*  
(Villers, 1789)

\*личинка

\*імаго

### ЗНИКАЮЧИЙ

Вид знижує чисельність через господарське та рекреаційне освоєння приморських пісків та заліснення.